

癌腫	レジメン	薬剤	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	特記事項
膵臓癌	GEM単独療法(3投1休)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	1,8,15日目	28日	
膵臓癌	nab-PTX+GEM	nab-パクリタキセル	125mg/m ²	点滴	1,8,15日目	28日	
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	1,8,15日目		
膵臓癌	FOLFIRINOX療法	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	1日目	14日	
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴	1日目		
		イリノテカン	180mg/m ²	点滴	1日目		
		フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	1日目		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間持続静注	1日目		
膵臓癌	nal-IRI+5-FU+LV療法	nal-イリノテカン	70mg/m ²	点滴	1日目	14日	
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴	1日目		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間持続静注	1日目		
膵臓癌	mFOLFIRINOX療法	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	1日目	14日	
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴	1日目		
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴	1日目		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間持続静注	1日目		
膵臓癌	GEM+erlotinib療法	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	1,8,15日目	28日	
		エルロチニブ	100mg/day/body	内服	連日		
膵臓癌	TS-1+GEM療法(膵がん)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	1,8日目	21日	術前補助化学療法
		S-1	80mg/m ² /day	1日2回内服	1日目-14日目		
胆道・胆管癌	GEM単独療法(3投1休)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	1,8,15日目	28日	
胆道・胆管癌	GC療法(胆道・胆嚢)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	1,8日目	21日	
		シスプラチン	25mg/m ²	点滴	1,8日目		